

FENTAPILL FACT SHEET

Fentanyl is a synthetic opioid that is up to **50X** stronger than heroin and **100X** stronger than morphine.



2 SALT-SIZED GRAINS OF FENTANYL CAN KILL.

TWO TYPES OF FENTANYL:

Pharmaceutical Fentanyl

- Prescribed and obtained from a licensed physician or pharmacy

Illicitly Manufactured Fentanyl (IMF)

- Made and distributed through illegal drug markets with no quality control

ILLICIT PILLS DON'T COME WITH AN INGREDIENT LIST...

YOU CANNOT SEE, TASTE, OR SMELL FENTANYL.

IMF is often added to other drugs because of its extreme potency, which makes drugs:

- cheaper to make
- more powerful
- more addictive
- more dangerous



COUNTERFEIT PILLS *AKA FENTAPILLS*

They are pills made to look like real prescription medications you get from a pharmacy.

They look real in many ways:

- ✗ size ✗ coloring ✗ stamps ✗ packaging

Fake pills may contain more or less of the active ingredient, harmful ingredients, or the wrong medication altogether.

Fake pills are made to look like **prescription opioids**, such as oxycodone (Oxycontin®, Percocet®), hydrocodone (Vicodin®), and alprazolam (Xanax®); or **stimulants** like amphetamines (Adderall®).

One pill, or **even half of a single pill**, could be lethal. Experimentation or self-medication can be fatal.


PEOPLE ARE OFTEN UNAWARE FENTANYL HAS BEEN ADDED

Pills purchased on social media, received from a friend, or bought online **are not real**.

The only safe medications are ones that come from licensed and accredited medical professionals. Pills purchased outside of a licensed pharmacy are illegal, dangerous, and potentially lethal.

107,622 IN OVERDOSE DEATHS IN 2021
FUELED BY FENTANYL

6 OUT OF EVERY 10
PILLS CONTAIN A POTENTIALLY
LETHAL DOSE



2018 - 2021
YOUTH
DEATHS
(AGED 14-18)
GREW BY
356%

SIGNS OF AN OVERDOSE

Recognizing the signs of opioid overdose can save a life. Here are some things to look for:

- Small, constricted “pinpoint pupils”
- Falling asleep or losing consciousness
- Slow, weak, or no breathing
- Choking or gurgling sounds
- Limp body
- Cold and/or clammy skin
- Discolored skin (especially in lips and nails)

It may be hard to tell if someone is experiencing an overdose. If you aren't sure, it's best to treat it like an overdose and call 9-1-1 immediately – it could save a life.



In 2021, 66.8% of drug overdose deaths had at least one potential opportunity for intervention.

Naloxone is a life-saving medication that can reverse the effects of opioid overdose and save lives.



NATURAL HIGH

HOJA INFORMATIVA SOBRE LAS PASTILLAS DE FENTANIL

El Fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.



EXISTEN DOS TIPOS DE FENTANIL:

Fentanilo farmacéutico

- Recetado por un médico licenciado y adquirido en una farmacia acreditada.

Fentanilo de fabricación ilícita (IMF, en inglés)

- Fabricado y distribuido a través de mercados de drogas ilegales, sin control de calidad.

LAS PASTILLAS ILEGALES NO VIENEN CON NINGUNA LISTA DE INGREDIENTES ACTIVOS O INACTIVOS.

EL FENTANIL NO SE VE, NO TIENE OLOR NI SABOR.

El Fentanilo de fabricación illegal (IMF) suele mezclarse con otras drogas por su potencia extrema, haciendo que las drogas sean:

- más baratas de fabricar
- más potentes
- más adictivas
- más peligrosas

BRECHA DEL CONOCIMIENTO

58%

Sólo el 58% de los jóvenes conocía que el Fentanilo era peligroso.

PASTILLAS FALSIFICADAS AKA QUE CONTIENEN FENTANIL

Son píldoras que se fabrican para parecerse a los medicamentos de venta con receta médica que se adquieren en las farmacias.

Se parecen a los medicamentos reales en:

- ✖ su tamaño, color, sello de la marca, y embalaje

Las pastillas falsas pueden contener más o menos cantidad del principio activo del medicamento, ingredientes dañinos para la salud o incluso ingredientes que no tengan que ver con la medicación en sí.

Las píldoras falsas se fabrican para que se parezcan a los opioides de receta médica como la oxicodeona (Oxycontin®, Percocet®), la hidrocodona (Vicodin®), y el alprazolam (Xanax®) o a los estimulantes como las anfetaminas (Adderall®).

Una píldora, o incluso la mitad de la pastilla, puede ser letal. La experimentación con estas pastillas o la automedicación puede ser mortal.


Las personas suelen desconocer que el fentanilo se ha agregado a las pastillas que se compran en las redes sociales, que se consiguen a través de un amigo-a o que se compran en línea y que, por lo tanto, no son las verdaderas pastillas.

Los únicos medicamentos que son seguros son los que han sido recetados por profesionales médicos licenciados o acreditados. Las pastillas que se compran fuera de una farmacia acreditada son ilegales, peligrosas y potencialmente letales.

107,622

MUERTES POR SOBREDOSIS EN 2021 ALIMENTADAS POR EL FENTANIL

6 DE CADA 10*
PASTILLAS CONTIENEN UNA DOSIS POTENCIALMENTE LETHAL



2018 - 2021
LAS MUERTES DE
ADOLESCENTES DE ENTRE 14 Y 18 AÑOS AUMENTARON EN UN 356%

SÍGNOS Y SÍNTOMAS DE UNA SOBREDOSIS DE OPPIOIDE

Reconocer los signos de una sobredosis de opioide puede salvar una vida. Estos son algunos de los más comunes:

- Pupilas pequeñas y contraídas
- Quedarse dormido-a ó perder el conocimiento.
- Respiración lenta, débil o nula.
- Sonidos de axfisia, gorgoteo o ronquidos.
- Cuerpo flácido.
- Piel fría y/o húmeda.
- Piel descolorida (sobre todo en los labios y las uñas).

Puede que sea difícil predecir que alguien está experimentando una sobredosis. En caso de duda, lo mejor es siempre considerar que se trata de una sobredosis y llamar al 911 inmediatamente – puede salvar una vida.

66.8%

In 2021, el 66,8% de las muertes de sobredosis de drogas tuvieron, al menos, una gran oportunidad de intervención.

La Naloxona es un medicamento que puede revertir los efectos de una sobredosis de opioides y salvar vidas.

